

Семинар-тренинг

«Интеграция детей, затронутых
эпидемией ВИЧ-инфекции,
в образовательную среду»

Название организации,
проводящей семинар-
тренинг



объединимся ради детей!

Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку

Презентация 7



объединимся ради детей!

Женщины инфицируются ВИЧ половым путем в 2–3 раза чаще, чем мужчины

Факторы уязвимости женщин к ВИЧ:

- объем и доза ВИЧ в сперме;
- время контакта с инфицированной спермой;
- строение слизистой влагалища и шейки матки;
- наличие воспалительных и деструктивных заболеваний женской половой сферы

Ежегодно в России у ВИЧ-положительных женщин рождается более 7 тыс. детей

Передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку можно предотвратить

При своевременно начатом и правильно проведенном лечении риск инфицирования новорожденного ВИЧ можно снизить до 1–2%

ВИЧ-инфекция и беременность

Беременность при ВИЧ-инфекции не осложняет и не ускоряет течение ВИЧ-инфекции у женщины (кроме поздних стадий ВИЧ-инфекции)

ВИЧ-инфекция не влияет на течение беременности (кроме поздних стадий ВИЧ-инфекции)

Факторы, препятствующие инфицированию плода

Сперматозоид и яйцеклетка **стерильны**
(никогда не содержат ВИЧ!)

Разные (**не смешивающиеся**) круги
кровообращения у матери и плода

Плацентарный барьер, **не пропускающий ВИЧ**
(но пропускающий антитела к ВИЧ)

С целью профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку:

- проводится **двукратное тестирование беременных** – при первом обращении в женскую консультацию и в третьем триместре беременности;
- женщин, не обследованных во время беременности, **тестируют на ВИЧ** при поступлении на роды;
- женщину **консультируют** до и после обследования на ВИЧ, а также по вопросам беременности при ВИЧ, профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку, вскармливания младенца и ухода за ним

Методы профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку

Медикаментозная профилактика: назначение женщине антиретровирусных препаратов с 28-й недели беременности

Бережное ведение родов: уменьшение времени контакта инфицированной крови и выделений матери с кожей и слизистыми оболочками ребенка в родах, при показаниях – плановое кесарево сечение

Послеродовая профилактика: назначение новорожденному антиретровирусной терапии в течение первых 6 недель жизни и отказ от кормления грудью (рекомендовано искусственное вскармливание младенца)

Спасибо за внимание !



объединимся ради детей!