

# Семинар-тренинг

«Интеграция детей, затронутых  
эпидемией ВИЧ-инфекции,  
в образовательную среду»

Название организации,  
проводящей семинар-  
тренинг



объединимся ради детей!

# Профилактика заражения ВИЧ «Аварийные» ситуации

Презентация 8

# Профилактика ВИЧ-инфицирования

**Соблюдение всех мер защиты при оказании первой помощи и своевременно проведенные профилактические мероприятия при возникновении «аварийных» ситуаций снижают вероятность инфицирования персонала до нуля**

# Данные ВОЗ о фактах инфицирования медработников за время эпидемии ВИЧ во всем мире

Риск передачи ВИЧ при повреждении кожи (прокол иглой) составляет **0,32%**

При попадании инфицированного биологического материала на слизистые – **0,03%**

Неповрежденная кожа – **непреодолимый барьер** для ВИЧ

# **Санитарно-гигиенический режим в детских коллективах**

**Одноразовый медицинский инструментарий**

**Аптечка первой помощи, укомплектованная перчатками**

**Набор медикаментов должен включать 3%-й раствор перекиси водорода, антисептики**

**Медицинская помощь оказывается в латексных или резиновых перчатках**

# Санитарно-гигиенический режим в детских коллективах

**При контакте с кровью:**

- при загрязнении рук кровью – обработать тампоном, смоченным 3%-м раствором перекиси водорода или 70%-м раствором спирта в течение 30 секунд; дважды вымыть под проточной водой с мылом, насухо вытереть чистой салфеткой;
- при повреждении кожных покровов острыми предметами – выдавить кровь из ранки, промыть место ранения под проточной водой с мылом, обработать место ранения антисептиком (перекись водорода, йод и т.п.);
- при попадании крови на слизистые глаз – промыть глаза 1%-м раствором борной кислоты или большим количеством воды;
- при попадании крови на слизистую рта – прополоскать рот 1%-м раствором борной кислоты или большим количеством воды

# Санитарно-гигиенический режим в детских коллективах

Если произошел прокол кожи иглой от шприца, порез нестерильным инструментом или если чужая кровь попала на слизистые оболочки, необходимо проконсультироваться с районным инфекционистом или обратиться в центр по профилактике и борьбе со СПИДом в течение **72 часов** с момента возникновения «аварийной» ситуации (**лучше – в первые 24 часа**) для решения вопроса о назначении медикаментозной профилактики

**Через 72 часа после возникновения «аварийной» ситуации профилактические мероприятия считаются неэффективными!!!**

**Лучшее решение проблемы оказания медицинской помощи при травмах – **снижение травматизма** у детей**

**Дети, которые усвоили правила общения и совместных игр, которые заняты делом, которые чувствуют внимание взрослых, не разрешают конфликты с помощью драки**

Спасибо за внимание !

